

ORVOSSZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ COLONOSCOPIÁRÓL

Tisztelt Betegünk!

Önnél vastagbél megbetegedésre utaló panaszok észlelhetők, így ennek okát kell tisztázni. Erre két lehetőség van: a vastagbél röntgen vizsgálata és közvetlen megtekintéssel, szem ellenőrzés mellett végzett, ún. endoscopos vizsgálata. Az Ön esetében mi az utóbbi beavatkozást tervezzük végrehajtani. Az alábbiakban tájékoztatjuk a vizsgálattal kapcsolatos minden részletről, beleértve az ezzel járó kockázatokat is.

Előkészítés:

A vizsgálat előtt szükséges, hogy a vastagbélből eltávolítsuk a béltartalmat, székletet. Ezt szolgálja az a folyamat, amit az írásos tájékoztató alapján (amit korábban kapott kézhez) Ön már elvégzett és előkészült a vizsgálatra, illetve labor vizsgálat és belgyógyászati vizsgálat történt.

A vizsgálat rövid leírása:

A vizsgálat rövid altatásban történik, amit altatóorvos végez, így a vizsgálat előtt 6 órával nem fogyaszthatott ételt és nem ihatott folyadékot. A vizsgálat során, a végbélen keresztül fekvő helyzetben egy flexibilis (hajlékony) üvegszál-optikás eszközt vezetünk fel (colonoscop), amely video jel segítségével monitoron keresztül láthatóvá teszi a vastagbelet.

Megtekintésre kerül a teljes vastagbél: ún. sigma, leszálló-, haránt- és felszálló vastagbél, a coecum és a vékonybél utolsó szakasza (terminális ileum). A bél belső felszínének, a nyálkahártyának az áttekintésekor látható, ha gyulladás, fekély, polipszerű kiboltosulás, daganatszövet, zsákszerű kiöblösödés, szűkület, esetleg bárhol vérzés észlelhető. A talált elváltozás, illetve a szövettani eredmény határozza meg, hogy továbbiakban milyen kezelésre lesz szükség.

Ha az előkészítés elégtelen, a széklet zavarhatja a vizsgálatot. A bélen belüli előre haladást a colonoscoppal levegő befúvás és a béltartalom kiszívás segíti.

A vastagbél tükrözés azért is előnyös vizsgálat, mert a talált elváltozásból szövettani mintát lehet venni, ezen mintavétel után, azonban ha korábban nem is volt, de lehetséges vérzés.

A vizsgálat után:

Mivel a vizsgálat altatásban történik, utána kb. 1-2 órás megfigyelés szükséges, amire kórházunk kórtermében kerül sor, ezen megfigyelés után kísérővel távozhat a kórházból, autót nem vezethet és célszerű, hogy pihenjen, alkoholos italt ne fogyasszon. Még otthonában is lehetséges, hogy bélgázok ürülnek.

Kockázatok:

A vizsgálat, mivel Ön alszik, nem kellemetlen, a cső okozta sérülés, átfúródás százezer vizsgálatból egy alkalommal fordulhat elő, ebben az esetben, azonnali műtét válik szükségessé. Ez a mi kórházunk vonatkozásában, úgynevezett „háttér-intézményben”, másik kórházban történik, ahova Önt átszállítjuk.

Ezt a tájékoztatót elolvastam, megértettem, a felmerülő kérdéseimre a vizsgáló orvostól feleletet, választ kaptam.

Kelt:

.....
felvilágosítást adó gastroenterológus
szakorvos aláírása és pecsétje

.....
páciens aláírása