

## ORVOS-SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ GASTROSCOPOS VIZSGÁLATHOZ

### Tisztelt Betegünk!

Panaszai és tünetei miatt a nyelőcső, gyomor és nyombél pontosabb vizsgálatára van szükség. Ennek legkorszerűbb módja a gastroscopia, amely lehetőséget biztosít ezen területek pontos megítélésére közvetlen megtekintés útján.

A vizsgálat otthoni előkészítést nem igényel. Kérjük, 12 óras éhezés után érkezzen: ez idő alatt szilárd táplálékot nem fogyaszthat. Közvetlenül a vizsgálat előtt 3 órával már csak vizet ihat.

Az eszköz levezetése a szájon át történik, ezért a kivehető fogsort el kell távolítani. Az eszköz levezetése előtt felszíni érzéstelenítést alkalmazunk. Amennyiben Ön Lidocain érzékeny, erre nem kerülhet sor. Ebben az esetben kábító hatású injekcióval tudjuk mérsékelni a kellemetlenséget. A vizsgálat tulajdonképpen fájdalommentes. A torok és garattájon okoz elsősorban kellemetlenségérzést. Mivel a vizsgálat közben levegőt fújunk be, hogy a nyálkahártyát láthatóvá tegyük, ez feszítő érzését okozhat. Amennyiben nem találunk kórjelző elváltozást, a vizsgálat nem tart tovább 5 percnél. Természetesen a kóros állapotok a beavatkozást sokkal komplikáltabbá, ezáltal időigényesebbé tehetik. A vizsgálatnál a nyelőcső, a gyomor és a nyombél rendellenességek felismerhetők: a nyelőcsőben gyulladást, vérzést, visszértágulatot, fekélyt, daganatot, kiöblösödést, szűkületet és a gyomorváladék visszacsorgására utaló jeleket láthatunk.

A gyomorban ugyancsak látjuk a gyomorfal gyulladását, vérzését, fekélyét, daganatát, polypot, tágulatát, szűkületét, majd a gyomorkimenet tágasságát, szűkületét, epés visszacsorgást a gyomorba. A nyombélben a leggyakoribb a fekély, amely gyakran vérzik, daganat itt ritkán látható, a nyombélben is lehetséges kiboltosulás, ún. diverticulum vagy felületes gyulladás. A vizsgálat közben szövettani mintavételre van lehetőség és közvetlen gyógykezelésre is. Ez utóbbi vérzéscsillapítás, idegen test eltávolítás, polyp levétel lehet.

A vizsgálatot követően, amennyiben nyugtató injectiót kapott, autót nem vezethet, egyébként a vizsgálat után élheti szokásos életét, a garatérzéstelenítés miatt 1 óráig nem étkezhet és nem ihat. A beavatkozás után felléphet rekedtség, garattáji, illetve torokfájdalom. A vizsgálat után lehetséges kisebb vérzés felületes sérülésből, szövettani mintavétel, polyp eltávolítás után. Ha otthon vérzést észlel hányás vagy széket útján, azonnal hívja a vizsgáló orvost, vagy Kórházunkat, hiszen gyógyszeresen kezelni kell, csak a nagyobb vérzés igényel vérkészítményekkel transfúziót. A garat, a nyelőcső, gyomor, vagy nyombél perforációja igen ritka szövődmény, ha ez előfordul, háttérintézetben kerül sor a műtéti ellátásra. Ha nem tudott róla, akkor is előfordulhat az érzéstelenítő vagy nyugtató gyógyszerrel szembeni túlérzékenység, allergia. Amennyiben a vizsgálat után panaszok jelentkeznek, forduljon telefonon a vizsgáló orvoshoz, vagy Kórházunkhoz.

Amennyiben a fentiek mellett további kérdései vannak, azokat személyesen tegye fel a vizsgálatot végző orvosnak.

Kérjük, hogy **aláhúzással válaszoljon az alábbi kérdésekre:**

Tud valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről:	igen	nem
Tud vérzékenységről:	igen	nem
Szed véralvadásgátló gyógyszert:	igen	nem
Szed egyéb gyógyszert:	igen	nem
Mit? .....		
Van-e epilepsziája:	igen	nem
Van-e zöldhályogja:	igen	nem
Van-e beültetett szívritmus-szabályozója:	igen	nem
Fennáll-e terhesség:	igen	nem
Van-e egyéb betegsége:	igen	nem
Mi az? .....		
Van-e kivehető foga:	igen	nem

**Kijelentem, hogy a vizsgálatról részletes tájékoztatást kaptam, beleértve a kockázatokat és mellékhatásokat. Ezeket tudomásul véve a vizsgálatba beleegyezem.**

Budapest, .....

.....

.....

KPS pont pecsétje:

 **Diagnostika**  
www.kps.hu  
*„Tudomány a betegek szolgálatában”*

a vizsgálatot végző orvos aláírása

a beteg (jogi képviselő) aláírása